

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Основные физико-химические свойства:** прозрачный раствор розового цвета;

**Состав:**

*5 мл сиропа содержит:* дифенгидрамина гидрохлорида (димедрола) 14,08 мг; хлорида аммония 138 мг; натрия цитрата 57,03 мг, ментола 1,14 мг;

*вспомогательные вещества:* натрия бензоат, лимонная кислота, сахар, глюкоза жидкая, метилпарабен натрия, пропилпарабен натрия, сорбитол, краситель пунцовый 4R, малиновая эссенция, деминерализованная вода.

**Форма выпуска:** Сироп.

**Фармакотерапевтическая группа:** Комбинированные препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях.

**Код АТС:** R05X.

**Фармакологические свойства:**

**Фармакодинамика.** Препарат подавляет спастический кашель, уменьшает боль в горле и облегчает дыхание. Дифенгидрамин (димедрол) уменьшает или полностью подавляет гистаминовый отек тканей, снижает проницаемость капилляров и гистаминовую гипотензию. Имеет умеренное противорвотное (благодаря своему центральному антихолинэргическому эффекту), местное анестезирующее, слабое спазмолитическое, противовоспалительное, седативное и снотворное действие. Другие компоненты препарата действуют антисептически, разжижают бронхиальный секрет и способствуют его выделению.

**Фармакокинетика.** Действие препарата является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биологических исследований.

**Показания для применения:** Симптоматическое лечение воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, в частности простуды, гриппа, острых респираторных инфекций, бронхитов, аллергических ринитов.

**Способ применения и дозы:** Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 2 чайные ложки 2-3 раза в день после еды.

Рекомендуемая доза для детей в возрасте с 2-х до 12 лет 1 чайная ложка сиропа 1 – 2 раза в сутки после еды.

Продолжительность лечения определяет врач в каждом случае индивидуально.

**Побочное действие:** Препарат может вызвать головокружение, сонливость, сухость во рту и горле, тошноту, нервозность. Иногда наблюдаются бессонница, возбуждение, дрожь. Наблюдались смена тонуса мускулатуры. Описаны также аллергические реакции (кожная

сыпь, зуд), нарушение зрения, анемия, затрудненное мочеиспускание, повышение аппетита и увеличение массы тела.

**Противопоказания:** Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата, тахикардия, боль в области сердца, бронхиальная астма, глаукома, сахарный диабет. Выраженные нарушения функции печени и почек, метаболический алкалоз. Детский возраст до 2 лет. Периоды беременности и лактации.

**Передозировка:** В случае передозировки возникают реакции со стороны центральной нервной системы от состояния к угнетению возбуждения. Реакции возбуждения чаще возникают у детей. Могут наблюдаться сухость во рту, фиксированные расширенные зрачки, покраснение кожи, желудочно-кишечные нарушения.

**Лечение.** Прием активированного угля, промывание желудка, прием водно-солевых растворов.

**Особенности применения.** С осторожностью назначают пациентам с пептической язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. Не назначают пациентам перед применением наркоза. Во время лечения препаратом не рекомендуется управлять автотранспортом и работать со сложными механизмами. Препарат может вызвать у детей галлюцинации, слабость, возбуждение, рефлекторный бронхоспазм, поэтому это необходимо учитывать при назначении. Препарат с осторожностью назначают лицам пожилого возраста, поскольку он может вызвать головокружение, сонливость, артериальную гипотензию.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** Одновременное применение препарата с ингибиторами MAO, успокоительными средствами, обезболивающими, антидепрессантами приводит к усилению его эффектов. Главным образом у взрослых одновременный прием препарата с трициклическими антидепрессантами может привести к усилению его побочных действий. Одновременное употребление алкоголя при приеме Кофанол сироп усиливает его воздействие на центральную нервную систему.

**Условия и срок хранения:** Хранить в недоступном для детей, темном месте при температуре не выше 25°C .

**Срок годности:** 3 года.

**Упаковка:** По 100 мл или 200 мл во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.

**Условия отпуска:** Без рецепта.

**Производитель:** Наброс Фарма Pvt. Лтд. Адрес Нешионал Хайвей №8, Каджипура, Кеда, Индия.